


Příloha zprávy č. 21 - Výstupy programu RimPro

19-08-2013




1. Obaleč jablečný


1.1 Jižní Morava – Stošíkovice




1.2 Východní Čechy – Kamenice




1.3 Střední Čechy – Slaný



1.4 Jižní Čechy – Temelín



1.5 Západní Čechy – Klášterec nad Ohří




Vysvětlivky ke grafům: unmated females=neoplozené samičky; mated females=oplozené samičky; old female adults= samičky, které již vykladly; eggs=vajíčka; hatching larvae=líhnoucí se larvy; forecasts=předpověď


Aktuální komentář k obaleči jablečnému: V teplejších polohách (jižní Morava) pokračuje hromadné líhnutí housenek 2. generace obaleče. V klimaticky chladnějších oblastech (grafy Klášterec n. O., Kamenice) model poukazuje na velmi slabou 2. generaci - nutno ale konfrontovat s reálnou situací (úlovky v lapácích, čerstvé závrtky).

2. Strupovitost


2.1 Jižní Morava – Stošíkovice




2.2 Východní Čechy – Kamenice




2.3 Střední Čechy – Slaný



2.4 Jižní Čechy – Temelín




2.5 Západní Čechy – Klášterec nad Ohří



Vysvětlivky ke grafům: light=mírná infekce; moderate=střední infekce; severe=vysoká infekce; forecast=předpověď

■ infekce na listech

■ infekce na plodech



tmavě modrá = srážky
světle modrá = období ovlhčení listů